© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

No. 61.

LINNÆA,

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.
7 Elsheimerstrasse 7.

TAUSCH-CATALOG No. 3, 1885
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Verzeichniss Senegambischer Conchylien.

Die näheren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.
Murex.	
cornutus L.	2—5
cristatus Broc. var.	0,50-60
fasciatus Sow.	0,80-1,20
gibbosus Lm.	2—3
lyratus Ads.	1—2
Pollia.	
excavata Dkr.	0,30-50
lineata Gm.	0,40-60
Fusus.	
Boettgeri v. Maltz.	1-2,50
morio L.	1—3
Genota.	
papalis Reeve	1,50-4
Crassispira.	
callosa Kien.	2—3
carbonaria Rve.	1-1,50
consociata Smith	2—3
laevisulcata v. Maltz.	1-1,50
Drillia.	
tripter v. Maltz.	1—2
Clavatula.	
bimarginata Lm.	1,50-3
Colini v. Maltz.	2—4
diadema Kien.	1-2,50
muricata Lm.	2—3
sacerdos Rve.	1—2
rubrifasciata Rve.	3—5
Pusionella.	
aculeiformis Lam.	2—4
nifat Ads.	1—3
Recluziana Petit.	3—4
vulpina Born.	2—4
Tritonium.	
ficoides Rve.	1—3
olearium L.	1—2
Phos.	
Grateloupiana Pet.	0,80-1,50
Cyllene.	
lyrata Lm.	0,80-1,20
Desmoulea.	
pinguis Ads.	2,50-4
Pseudostrombus.	
politus Lm.	0,30-50

	Mk.
Nassa.	
miga Brug.	0,30-60
Mülleri v. Maltz.	0,50-80
semistriata Broc. (maculata Ads.)	0,30-40
Purpura.	
Forbesi Dkr.	0,40-60
haemastoma L.	0,20-50
neritoidea L.	0,40-60
Oliva.	
flammulata Lm.	0,20-60
hiatula Lm.	0,30-60
pulchella Ducl.	0,40-60
Steeriae Rve.	0,50-60
Tudicla.	
afra Gmel.	2—3
Plicatella.	
filosa Wagn.	2—4
Cymbium.	
cymbium Lm.	1-2,50
navicula Gmel.	1-2,50
porcinum Lm.	1,50-2,50
Conohelix.	
carbonacea Rve.	0,50-2
Marginella.	
Adansoni Lm.	1,50-2,50
aurantia Lm.	1,50-2
amygdala Lm.	0,40-60
bifasciata Lm.	2—3
cornea Lm.	0,80-1
cincta Kien.	1,50-2
cingulata Dillw.	0,20-30
Cleryi Pet.	1,50-2
faba L.	1,50-2,50
Goodalli Sow.	12—18
glabella L.	1—2
harpaeformis Beck.	1,50-2
laeta Jouss.	1-1,50
monile Lm.	0,20-30
olivaeformis Kien.	1-1,50
oryza Lm. var.	0,30-40
persicula L.	0,30-50
pseudofaba Sow.	12—16
triticea Lm.	0,20-40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Columbella.	
cribraria L.	0,20-30
Freytagi v. Maltz.	0,60-80
striata Ducl.	0,30-50
Natica.	
collaria Lm.	0,40-80
fanel Reclz.	0,60-1
fulminea Gm.	0,50-1,20
var. punctata Swains.	0,50-1
Loveni Dkr.	0,40-1
variabilis Reclz.	0,50-80
Scalaria.	
pseudoscalaris Broc.	0,40-80
Terebra.	
cinerea Born.	0,30-40
Conus.	
Genuanus L.	3—5
mercator L.	1—4
testudinarius Mart.	1—3
papilionaceus Hwss.	1—5
Strombus.	
fasciatus Gmel. (bubonius)	2—3
Cypraea.	
lurida L.	0,40-80
nebulosa Kien.	2-2,50
sanguinolenta Gmel.	1—2
Sowerbyi Kien.	1-2,50
stercoraria L.	1-1,50
Tympanotonos.	
radula L.	0,60-80
Turritella.	
aspera Ad. et Rve.	1—2
trisulcata Lm.	0,60-80
Mesalia.	
brevialis Lm.	1-2,50
Freytagi v. Maltz.	1,50-3
Smithia.	
gracilis v. Maltz.	6—15
Calyptraea.	
vulgaris L.	0,60-1,50
Crepidula.	
aspersa Dkr.	0,20-40
v. fasciata	0,20-40
v. unicolor	0,20-40
Littorina.	
pulchella Dkr.	0,20-40
Nerita.	
Senegalensis Gmel.	0,30-40
Trochus.	
magus L. f. Senegal.	0,30-40
punctulatus Lm.	0,30-40

	Mk.
Fissurella.	
alabastrites Rve.	0,30-50
Dentalium.	
dentale L.	0,20-40
v. rosea	0,30-40
Maltzani Dkr.	0,80-1,50
Patella.	
Adansoni Dkr.	0,30-60
caerulea L.	0,20-30
electrina Rve.	0,40-60
Bulla.	
Adansoni Phil.	0,30-50
Siphonaria.	
venosa Rve.	0,30-50
Corbula.	
sulcata Lm.	0,30-50
Tellina.	
exilis Lm.	0,50-80
Donax.	
rugosus L.	0,20-30
Venus.	
affinis Sow.	1—2
rosalina Rang	1—2
Cardium.	
Kobelti v. Maltz.	0,60-1,50
pulchrum Hinds	0,40-80
Ungulina.	
alba Rang.	1-1,50
Crassatella.	
Paeteli v. Maltz.	0,60-1,50
Chama.	
Senegalensis Rve.	2—5
Cardita.	
ajar Brug.	0,60-1,50
Pectunculus.	
spadiceus Rve.	0,50-1,50
scriptus Lm.	0,50-2
Leda.	
bicuspidata Gould	0,30-40
Lithodomus.	
caudigerus Lm. f. minor	0,30 40
Arca.	
Geissei Dkr.	0,40-80
Mytilus.	
Charpentieri Dkr.	0,30-50
africanus Chm.	0,40-60
Modiola.	
barbata L.	0,20-40
Ostrea.	
Guineënsis Dkr.	0,30-60

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren
Briefe einfach an die „**LINNÆA**", **Naturhist. Institut**
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

No. 62. **LINNÆA,** 1885.

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.
7 Elsheimerstrasse 7.

TAUSCH-CATALOG No 3,

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.
Oleacina.	
leucozonias Walch Jamaica	0,60-1,50
Philippiana Pfr. „	0,80-1,20
striata Müll. Bolivia	2-2,50
Streptaxis.	
costulatus v. Möll. China	0,80-1
Fuchsianus Gredl. „	1
Monrovianus Rang Liberia	1-1,50
sinensis v. Möllend. China	0,80-1
Wagneri Pfr. Brasil.	1-1,50
Gibbulina.	
funicula Val. Mauritius	0,40-50
Mauritiana Morl. „	0,40-50
pagoda Fér. „	1-1,50
palanga Fér. „	0,50
sulcata Müller „	0,50-1
Ennea.	
microstoma v. Möll. China	1
ovoidea Brug. Mayotte	1-50,2
Rhytida.	
Boydii Ang. Austral.	1,50-2
inaequalis Pfr. N. Caledon.	1
Leia.	
Maugeri Wood Jamaica	0,20-30
Macrocramus.	
claudens Gundl. Cuba	0,20-30
cylindricus Gray I. Tortola.	0,30
festus Gundl. Cuba	0,20-30
Gossei Pfr. Jamaica	0,30
Guildingi Pfr. Cuba	0,30-40
Poeyi Pfr. Cuba	0,30-50
Cylindrella.	
agnesiana C.B.Ads. Jamaica	0,40-80
arcuata Weinl. Haiti	0,80
brevis Pfr. Jamaica	0,30-50
Brooksiana Gundl. Cuba	1
camoensis Pfr. Cuba	0,20
chordata Pfr. St. Croix	0,50
clara Wright Mexico	2—3
cylindrus Ch. Jamaica	0,40
v. rosea C. B. Ads. „	0,30-40
elegans Pfr. Cuba	0,20-40
fabreana Poey „	0,80-1
fastigiata Gundl. „	0,60
gracilis Wood Jamaica	0,40-1,50
lateralis Poey Cuba	0,60-80
pallida Gould St. Thomas	0,40
perplicata Fér. Guadeloupe	0,40-50
Philippiana Pfr. Cuba	0,40-50
Poeyana d'Orb „	0,60
Rüsei Pfr. Portorico	0,60
Sauvalleana Gundl. Cuba	0,40-60
seminuda Ads. Jamaica	0,40-50
speciosa Dkr. Mexico	5
torquata Morl. Cuba	0,40-60
variegata Pfr. „	0,30-40
volubilis Morl. „	0,40-50
Buliminus.	
Bengalensis Lm. Australien	0,40-50
Cantori Bens. China	0,40-50
Dufresnii Leach. Tasmania	0,80-1,50
dux Pfr. Australien	1,50-2
insularis Ehrbg. Dahlak I.	0,20
Mageni Gass. N. Caledon.	0,50-80
pullus Gray Bengalen	0,20-30
sanguineus Barcl. Mauritius	1-1,50
velutina Pfr. Seychellen	0,80
Partula.	
abbreviata Mouss. Tahiti	0,50
arguta Pease Gesellsch.-I.	0,50
Australis Sow. „	0,40-50
canalis Mouss. „	0,60-1
faba Mart. „	0,60-80
gibba Fér. „	0,50
gracilis Pease Sandw.-Ins.	0,30-40
hebe Pfr. Gesellsch.-Ins.	0,30-60
Huaheinensis Garr. „	0,50
hyalina Brod „	0,20-50
inflata Reeve „	0,40-80
Layardi Braz. N. Hebriden	0,60
lignaria Pease Tahiti	0,50
lineolata Pease „	0,40
lirata Mouss. „	0,50-80
lugubris Pease „	0,50
Mastersi Pease „	0,40
nodosa Pfr. „	0,40
Otaheitana Brug. „	0,30-50
radiolata Pfr. N. Hibern.	0,40
Recluziana Pet. Gesellsch.-I.	0,60
rosea Brod. „	0,50-80
rustica Pease „	0,40
solidula Reeve „	0,50
sinistrorsa Pease Tahiti	0,30-40
trilineata „ „	0,40-50
Vanicorensis Quoy Vanicoro	0,50
variabilis Pease Raiatea	0,50
zebrina Gould Upolu	0,60
Auriculella.	
auricula Fér. Sandw.-Ins.	0,20-30
Achatinella.	
abbreviata Reeve Sandw.I.	0,60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
adusta Reeve Sandw. Ins.	0,60
bacca „ „	0,60-80
bulimoides Sw. „	0,60-80
biplicata Newc. „	0,80
citrina Migh. „	0,40-50
colorata Reeve „	0,60
crassa Newc. „	0,60
Dunkeri Cumg „	1
elegans Newc. „	0,80
fumosa Newc. „	0,50
lorata Fér. „	0,60
labiata Newc. „	0,40-50
nubilosa Migh. „	0,80
nucleola Gould „	0,40
ovata Newc. „	0,80
pallida Nutt. „	0,60
perversa Swains. „	0,60-80
prasina Reeve „	0,60
producta Reeve „	0,50
pulcherrima Swains. „	0,50-60
rugosa Newc. „	0,60
splendida Newc. „	1
subvirens Newc. „	0,60
Swifti „ „	0,80-1
taenicolata Pfr. „	0,60
tristis Pfr. „	0,40
turritella Fér. „	0,60
variabilis Newc. „	0,40
venusta Migh. „	0,40-50
virgulata Migh. „	0,40-50
viridana „ „	0,60
vulpina Fér. „	0,40-50
Spiraxis.	
mira Gredl. China	1—2
Stenogyra.	
bacillus Pfr. Cuba	0,40-50
calcarea Born. Brasilien	2—4
carracasensis Rve Venezuela.	0,20-30
cuneus Pfr. Brasilien	1,50-3
Haughtoni Bens. Andam.	0,50-80
homalogyra Shuttl. Cuba	0,20-40
Johanina Morl. Mayotte	0,30-40
obeliscus Moric. Brasilien	1,50-2
octona Ch. W. Indien.	0,20-30
octonoides Ads. St. Thomas	0,30
pyrgula Ads. Japan	0,30
riparia Pfr. Ecuador	0,40-60
subula Pfr. Hayti	0,30-40
sylvatica Spix Brasilien	0,40-1
Rhodea.	
gigantea Mouss. N. Granada	6
Glessula.	
Deshayesii Pfr. Ceylon	0,30-40

	Mk.
gemma Bens. Bengal.	0,30
notigena „ „	0,30-50
Tornatellina.	
gigas v. Mart. Ruck Ins.	2—5
Pupa.	
hunanensis Gredl. China	0,30-50
Strophia.	
chrysalis Fér. Cuba	0,40-50
cyclostoma Küst. „	0,40
glans „ Bahama	0,40
latilabris Pfr. (fossil) S. Croix	0,60
maritima Pfr. Cuba	0,60-80
Martensiana Küst. Portorico	0,30-40
mumia Lam. Cuba	0,40-60
striatella Fér. „	0,30-50
uva L. Jamaica	0,10-20
Weinlandi Kurr. Bahama	0,60-80
zebra Weinl. „	0,30-40
Megaspira.	
elatior Spix Brasilien	2—3
Clausilia.	
aculus Bens. China	0,40-50
v. labio Gredl. „	0,60-80
v. shangeiensis „	0,50
Adamsiana Pfr. Peru	2
bilabrata Smith Japan	1,50-2
brevior v. Mart. „	0,80-1
Cumingiana Pfr. Philippn.	1
cylindrica Gray Himalaya	0,80
Elisabethae v. Möll. China	0,80-1,20
exilis Ads. Formosa	3
Heldi Küst. Java	2
Japonica Cross. Japan	1,50
Javana Pfr. Java	2
Lorraini Mke. China	0,60-1
Martensiana Herkl. Japan	1—2
Möllendorfi v. Mart. China	0,50-60
perarata v. Mart. N. Granada	0,40-50
Peruviana Troschel Peru	4—5
Philippiana Pfr. Birmah	2-2,50
plathytera v. Mart. Japan	0,80-1
pluviatilis Bens. China	2—3
porphyrea v. Möllend. „	0,80-1,20
praecelsa Gredl. „	3—4
Semprinii Gredl. „	3—4
Sheridani Pfr. Formosa	3
Sieboldi Pfr. Japan	1—2
Stosarskie Lub. Peru	2,50
Swinhoei Pfr. Formosa	2—3
tau Bttg. Japan	0,80
v. Hunana Gredl. China	1
Taczanowskii Lub. Peru	3—4
tridens Chm. Portorico	0,20-40

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren
Briefe einfach an die **„LINNÆA", Naturhist. Institut**
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Verzeichniss exotischer Zweischaler.

I. Abtheilung.

		Mk.
Pholas.		
costata L.	Florida	5—6
einzelne Schalen		1-1,50
latissima Sow.	Manilla	2,—
Dactylina.		
Chiloënsis King.	Chile	4,—
Barnia.		
Manillae Sow.	Manilla	2,—
similis Gray	N.-Seeland	2,50
Pholadidea.		
melanura Sow.	Panama	0,20-50
Talona.		
clausa Gray	Gambia	3—4
Martesia.		
calva Sow.	Panama	1,50-2,50
pusilla L.	Jamaica	0,30-40
striata L.	W.-Indien	0,30-50
Fistulana.		
clava Lam.	Singapore	0,50-3
Clavagella.		
Australis Sow.	Austral.	2,—
Aspergillum.		
Javanum Lam.	Java	1-2,50
vaginiferum Lam.	M. rubr.	4—6
Solen.		
brevis Gray	Philippinen	0,40-80
gracilis Phil.	Japan	0,80
grandis Dkr.	Philippinen	0,60-1,50
Guineensis Gray	Guinea	0,60-80
Malaccensis Dkr.	Malacca	0,80-1
Timorensis Dkr.	Timor	1,—
Pharella.		
Javanica Lam.	Java	0,60-1
Cultellus.		
Australis Dkr.	Moreton Bay	0,60
Cumingianus Dkr.	Philipp.	0,80
Machaera.		
radiata L.	Sumatra	1-1,50
subsulcata Sow.	Singapore	0,60-80
Winteriana Dkr.	Java	1-1,50
Solecurtus.		
Cumingianus Dkr.	Bohol	0,50-80
exaratus Phil.	China	0,80-1,50
Tagelus.		
angulatus Sow.	W.-Afrika	0,60-1
Caribaeus Lam.	W.-Indien	0,50-80
Dombeyi Lam.	Chile	0,50-1
Novaculina.		
gangetica Bens.	Calcutta	0,30-50
mollis Gould.	China	1,—
Mya.		
Hemphillei Newc.	Californ.	0,80-1,20
Corbula.		
albuginosa Hinds	N.Guinea	0,20-30
carybaea D'Orb.	St. Thomas	0,40
Kieneriana Ads.	Jamaica	0,30-40
Lavalleana D'Orb.	St. Thom.	0,20-30
nasuta Sow.	„	0,40
sulcata Lam.	Gorée	0,20-40
trigona Hinds	Afrika	0,40-50
tunicata „	Port Jackson	0,40-60
Anatina		
truncata Lam.	Manilla	3—4
Lyonsia.		
cuneata Sow.	Californien	3,—
Neaera.		
ornatissima D'Orb.	St.Thom.	2,—
Mactra.		
achatina Chm.	M. rubr.	1,—
antiquata Spengl.	Manilla	0,80-1,20
carinulata Desh.	Südsee	1,50
decora Desh.	Australien	1,—
lurida Phil.	China	1,—
olorina Phil.	M. rubr.	0,60-80
opposita Desh.	Philippinen	0,60
ornata Gray	China	1,50
violacea Chm.	Singapore	1-1,20
Mactrella.		
alata Spengl.	Columbia	2—3
exoleta Gray	W.-Columbia	3,—
Hemimactra.		
corbuloides Desh.	Ceylon	0,60-1
Mulinia.		
antarctica Dkr.	Chile	1-1,50
Byronensis Gray	„	1—2
typica Gray	„	1,20
Lutraria.		
Australis Desh.	Moluccen	0,80-1,20
maxima Jonas	China	0,50-1,20
Merope.		
aegyptiaca Chm.	Singapore	0,60-1,50
Asaphis		
coccinea Mart.	St. Thomas	0,50-1,50
deflorata L.	M. ind.	0,30-1
dichotoma Ant.	Philippinen	0,30-60
violascens Forsk.	M. rubr.	0,30-80
Psammobia.		
lineolata Gray	N.-Seeland	0,50-1,50
Menkeana Reeve	Australien	0,50
tristis Desh.	Amboina	1,20
Sanguinolaria.		
rosea Lam.	Ceylon	1-1,20
Soletellina.		
Adamsi Desh.	Philippinen	2,—
Cumingiana Desh.	„	1—2

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
plannlata Reeve	Moluccen	2,—
solida „	Malacca	0,60-1
violacea Desh.	Philippinen	0,20-50
Elizia.		
orbiculata Wood	Australien	0,80-1
Tellina.		
angulata Chm.	Philippinen	1-1,50
chloroleuca Lam.	„	1,—
crucigera „	Oc. ind.	0.20-60
candida „	China	1,50
compressisima Reeve	Japan	1,20-2
cuspis Hanl.	W.-Amerika	0,50-1
Cumingi Hanl.	Antillen	2,—
Deshayesi Hanl.	M. rubr.	1-1,50
fausta Donov.	W.-Indien	0,60-2
foliacea L.	Massaua	0,60-1
interrupta Wood	Surinam	0,60-1
jubar Hanl.	Philippinen	2,—
lata Quoy et G.	N.-Caledon.	2—3
lacunosa Chm.	Guinea	1-1,50
lingua-felis L.	Philippinen	0,40-1
lineata Furt.	Antillen	0,30-50
Madagascariensis Gmel.	Madagascar	2-2,50
magna Spengl.	Antillen	2—3
marginalis Dillw.	Ostindien	0,80-1
perna Spengl.	Philippinen	0,40-60
pristis Lam.	Australien	0,80-1,20
punicea Born	Mexico	0.40-60
radiata L.	W.-Indien	0,40-1,20
v. unimaculata L.	„	0,20-1
rastellum Hanl.	Ostafrika	0,80-1,50
rostrata L.	Philippinen	1-3,50
rufescens Chm.	Antillen	0,60-1
remies L.	Philippinen	1,—
rugosa Born	„	0,40-60
scobinata L.	Tahiti	0,80-1,50
staurella Lam.	Philippinen	0,20-40
strigosa Gmel.	W.-Afrika	0,50-80
Timorensis Lam.	Timor	0,40-60
virgata L.	Philippinen	0,20-60
vulsella Chm.	„	0,60-1,20
Strigilla.		
carnaria L.	St. Thomas	0,20-40
festiva Semper	Australien	0,80 1
pisiformis L.	Oc. ind.	0,20
Macoma.		
galathea Lam.	Singapore	1,50-2,50
inornata Hanl.	Chile	1-1,50
Tellidora.		
Burnetti Brod. et. Sow.	Salango	2-2,50
Donax.		
assimilis Hanl.	Panama	0,30-50
bimaculatus L.	St. Thom.	0,20-30
v. alba	„	0,20-30
v. sexradiata	P. Cabello	0,20-30
carinatus Hanl.	Californien	0,80-1
Californicus Conr.	-	0,30-40
cuneatus L.	Tranquebr.	0,30-40
Deshayesi Dkr.	W.-Afrika	0,30-40
denticulatus L.	Antillen	0,20-40
dentifer Hanl.	Panama	0,40-60
Dohrni Jick	Massaua	0,40-80
elongatus Lam.	Sénégal	0,60-1
faba Chm.	Mauritius	0,20-30
ovalinus Desh.	Oc. pacif.	0,40-50
rugosus L.	W.-Afrika	0,60-1
scortum L.	C. b. sp.	1—2
serra Chm.	„	1,50-2
sulcatus Phil.		0,50-60
Galathea.		
Bernardi Dkr.	Gabon	3,50
concamerata Duv.	Guinea	5,—
radiata Lam.	Congo	3—4
Paphia.		
glabrata Desh.	Mauritius	0,30-50
Ceronia.		
donacia Desh.	Peru	1-1,50
Ervilia.		
nitens Turt.	Antillen	0,20-30
scaliola Issel	M. rubr.	0,20-30
Tivela.		
argentina Sow.	Peru	1—2
bicolor Gray	Sénégal	0,80-1,50
intermedia Sow.	Californien	1,—
mactroides Born	W.-Indien	0,80-1,20
planulata Brod. et Sow	Mazatl.	0,80-1
polita Sow.	Natal	0,60-80
radiata Sow.	Mazatlan	0,30-1
v. Hindsi Hanl.	Ganges	0,50-80
trigonella Lam.	Antillen	0,40-50
tripla L.	Guinea	0,50-1
undulata Sow.	Mazatlan	1-1,20
Meretrix.		
Lamarcki Desh.	China	2—3
lusoria Chm.	„	0,50-1
meretrix L. (impudica Lam.)	Siam	0,40-60
v. castanea Lam.	Oc. ind.	0,40-60
v. morphina Lam.	„	1,—
ovum Hanl.	Oc. ind.	0,80-1
petechialis „	Mazatlan	1—2
Callista.		
aurantiaca Gray	Californien	0,80-1,20
costata Chm.	Mauritius	0,50-1,50
erycina L.	Calcutta	0,80-1,50
festiva Sow.	O.-Indien	1-1,20
florida Lam.	M. rubr.	0,50-1
lilacina „	„	0,60-1,20
maculata L.	Mexico	0,50-1
pannosa Sow.	Chile	0,40-60
pulchra Gray	Australien	0,60-80
squalida Sow.	Californien	0,60-1
Caryatis.		
citrina Lam.	Australien	0,50-80
crocea Desh.	Philippinen	0,50-80
hebraea Lam.	M. rubr.	0,40-80
laeta L.	Philippinen	0,40-80
Kingi Gray	N.-Caledonien	0,80-1
obliquata Hanl.	Philippinen	0,50-80
subpellucida Sow.	-	0,60-1
varians Hanl.	Brasilien	0,40-80
Dione.		
brevispina Sow.	Australien	1—2

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
circinata Born	Mazatlan	1-1,50
dione L.	Antillen	1—3
lupinaria Less.	Peru	2—5
purpurata Lam.	Brasilien	2-2,50
semilamellosa Gould.	Peru	2—4
rosea Brod.	Panama	1—2
unicolor Sow.	W.-Columbien	0,50-1,50
Lioconcha.		
arabica Chm.	M. rubr.	0,20-50
castrensis L.	Mauritius	0,50-1,50
picta Lam.	„	0,40-60
tigrina „	Oc. ind.	0,40-60
Crista.		
discors Spengl.	M. rubr.	0,30-50
divaricata Chm.	„	0,30-60
gibbia Lam.	Philippinen	0,30-60
pectinata L.	„	0,30-60
transversaria Desh.	„	1,—
Circe.		
corrugata Ch.	M. rubr.	0,30-50
personata Desh.	Philippinen	0,40-80
scripta L.	„	0,20-80
Sunetta.		
Meroë L.	Ind. occ.	0,60-1,50
scripta L.	„	0,60-1
Tapes.		
adspersa Chm.	Philippinen	0.50-1
v. nocturna Chm.	„	0,40-80
Ceylonensis Desh.	Ceylon	0.50-1,20
Deshayesi Sow.	Philippinen	0,40-80
laterisulca Lam.	Malacca	0,50-1
litterata L.	Oc. ind.	0,20-1
Malabarica Chm.	Malabar.	0,40-80
Philippinarum Ads. et Reeve	Philippinen	0,20-40
rimularis Lam.	Australien	0,40-80
recens Chm.	Oc. ind.	0,50-60
sulcaria Lam.	Amboin	0,60-1
striata Chm.	Oc. ind.	0,40-50
turgida Lam.	Salanga	0.40-1
undulata Born	China	0,20-50
variegata Sow.	Philippinen	0,20-40
Katelysia.		
Peroni Lam.	Australien	0,80-1
scalarina Lam.	„	0,40-60
Gomphina.		
undulosa Lam.	Australien	0,30-50
Anaitis.		
calophylla Phil.	Australien	1—2
Isabellina „	„	0,60-80
lamellata Lam.	Tasmania	2—5
paphia L.	Philippinen	0,80-1,20
plicata Lam.	Senegal	2—4
tiara Dillw.	Philippinen	0,50-1
roborata Hanl.	Australien	0,80-1
Yatesi Gray	N.-Seeland	2—3
Cryptogramma.		
Brasiliana Lam.	Brasilien	0,40-60
flexuosa L.	N.-Granada	0,20-40
impressa Ant.	Oc. ind.	0,30-60
squamosa L.	Philippinen	0,40-60
subimbricata Sow.	Peru	0,40-60
subrugosa Ant.	Oc. ind.	0,40-80
Chione.		
asperrima Sow.	Trinidad	0,40-50
Amathusia Phil.	Californien	1—2
Californiensis Brod.	„	0,80-1
crispata Desh.	Philippinen	0,80-1,50
compta Brod.	Peru	1,50
crenulata Chm.	Oc. ind.	1—2
cygnus Lam.	China	2,—
cancellata Chm.	Antillen	0,30-50
Columbiensis Sow.	Columbia	0,80-1
cardioides Lam.	Panama	0,60-1
crassicostata Quoy	N.-Seel.	1,50
discors Sow.	Mexico	0,40-60
Dombeyi Lam.	Chile	0,50-1
exalbida Chm.	Falkl. Ins.	1-2,50
granulosa Gmel.	St. Thomas	0,30-40
gallinula Lam.	Australien	1,—
Gnidia Brod. et Sow.	Californ.	1—3
histrionica Sow.	Mazatlan	0,50-80
laqueata „	Australien	2—3
lacerata Hanl.	Philippinen	0,50-1,50
Listeri Gray	-	0,40-1
Lamarki „	China	0,60-1,20
marica L.	Mauritius	0,30-50
ornatissima Brod.	Panama	1,50
puerpera L.	Philippinen	0,60-1
rugosa Gmel.	W.-Indien	1—2
reticulata L.	Philippinen	0,50-1
simillima Sow.	Californien	1,—
Stuchburyi Gray	N.-Seeland	0,80-1,20
subnodulosa Hanl.	Philippin.	1,20
Dosinia.		
amphidesmoides Reeve	Philippinen	1,50
aspera Reeve	„	0,50
angulosa Phil.	Malacca	0,50-1
Adansoni Phil.	Senegal	1,—
Annae Carp.	W.-Columbien	2,—
anus Phil.	N.-Seeland	2,—
concentrica Born.	Brasilien	0,50-1,50
cretacea Reeve	M. rubr.	0,50-80
caerulea „	Australien	1,20
Dunkeri Phil.	Panama	0,50-1
v. simplex Hanl.	Californ.	0,50-1
discus Reeve	Antillen	1—2
eburnea Römer	Ceylon	1,—
Gruneri Phil.	China	1-1,50
histrio Gmel.	Philippinen	0,50-60
isocardia Dkr.	N.-Guinea	0,80-1
Japonica Desh.	Japan	1,50-2
laminata Reeve	Philippinen	1,—
Lüdersi Römer	Australien	1,50
labiosa Römer	„	1-1,50
Orbignyi Dkr.	Guinea	1,20
Patagonica Phil.	Patagonien	0,40-1
ponderosa Gray	Mazatlan	3—4
prostrata L.	Oc. ind.	1,50
plana Reeve	China	1—2
sculpta Hanl.	Australien	1,—
trigona Römer	„	1,—
variegata Chm.	Mauritius	0,40-50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Cyclina.	
Chinensis Ch. China	0,40-80
Cypricardia	
angulata Lam. Mauritius	0,50-1,20
Coralliophaga.	
laminata Reeve Mauritius	0,30-60
Petricola.	
divaricata Chm. Mauritius	0,30-40
Glauconome.	
chinensis Gray China	0,60-1,50
corrugata Reeve Philippin.	1-1,50
rugosa Hanl. Australien	0,80-1,50
Cardium.	
assimile Reeve Zanzibar	1-1,80
bicolor Sow. Mauritius	0,40-60
costatum L. W.-Afrika	1—4
elongatum Brug. Viti-Ins.	1—3
enode Sow. Ceylon	0,50-2,50
foveolatum Sow. M. rubr.	0,80-1
fimbriatum Wood. China	0,60-80
isocardia L. Antillen	1—2
latum Born Philippinen	1-1,50
multispinosum Sow. „	0,80-1,50
magnum Born Mexico.	1-1,50
muricatum L. W.-Indien	0,50-1,50
maculatum Sow. Mexico	0,50-1
Nuttali Conr. Nunivak	2—3
Petitianum D'Orb. St. Thom.	1,20
procerum Sow. C.-Amerika	1—2
pseudolima Lam. Ostindien	1—2
v. alba „	0,80-1,50
rugosum Lam. Philippinen	0,40-80
ringens Chm. Gambia	2—4
sinense Sow. China	0,80-1
tenuicostatum Sow. Austral.	2,—
vertebratum Jon. N.-Caledon.	0,60-1,50
Papyridea.	
bullata Lam. Mazatlan	0,60-1,20
papyracea Chm. Manilla	0,80-1,50
Laevicardium.	
attenuatum Sow. Ceylon	1,50-2,50
Australe Sow. Australien	0,40-60
biradiatum Brug. Philippin.	0,60-1
Elenensis Sow. St. Elena	0,80-
lyratum Sow. Ostindien	1-2,50
multipunctatum Sow. China	0,60-1,20
serratum L. W.-Indien	0,40-1
Hemicardium.	
auricula Forsk. M. rubr.	1—2
biangulatum Sow. St. Elena	1,50-2
cardissa L. Oc. ind.	0,50-2
v. Junoniae Lam. Salanga	0,50-2
Dionaeum Brd. et Sow. J. Anaa	0,80-1
exasperatum Sow. China	1,50-2
fragum L. China	0,40-60
Guichardi Bern. N.-Caledon.	3,—
graniferum Brod. Antillen	0,50-1
medium L. „	0,60-80
planicostatum Sow. Amer. c.	1,50-2,50
retusum L. Ind. occ.	0,80-1
subretusum Sow. Suez	0,80-1,50
tetragonum Voigt Moluccen	0,40-80
unedo L. Ind. or.	0,30-80
Isocardia.	
vulgaris Reeve China	1,50-2,50
Chama.	
arcinella L. W.-Indien	1—3
ferruginea Reeve Honduras	2—3
fibula „ Philippin.	0,50-1
frondosa Brod. W.-Amerika	2—3
imbricata „ Mauritius	1,—
Lazarus L. M. ind.	4—10
lobata Brod. China	0,50-2
pulchella Reeve Australien	1,—
macrophylla Chm. St. Thom.	1—6
reflexa Reeve Australien	0,60-3
Tridacna.	
crocea Lam. Philippinen	1—3
elongata Lam. „	0,50-2
rudis Reeve „	1,50-3
squamosa Lam. Moluccen	0,80-3,50
Hippopus.	
maculatus Lam. Ind. or.	1—2
Lucina.	
bicornis Reeve Philippinen	1,—
Fischeriana Issel Dahlak	0,30-40
Jamaicensis Lam. Jamaica	0,50-1,20
interrupta „ Singapore	1,—
punctata L. M. rubr.	0,60-1,50
Pensylvanica L. Antillen	1,50-2
rugifera Reeve N.-Caledon.	1-2,50
scabra Lam. Jamaica	0,20-40
tigrina L. St. Thomas	0,50-1,50
Loripes.	
chrysostoma Meusch Antillen	1,50-2
edentula Lam. N.-Caledon.	1,50-2
ovum Reeve Ostindien	1,—
Philippinarum Hanl. Manilla	1-1,50
Corbis.	
fimbriata L. Oc. ind.	1—2
Crassatella.	
Cumingi Ads. Australien	6,—
decipiens Reeve „	2-3,50
Kingicola Lam. „	3,—
Cardita.	
cardioides Reeve Philippin.	1,50
crassa Gray Mexico	1,50
incrassata Sow. Australien	1-1,50
laticostata „ Tasmania	1-1,20
Mytilicardia.	
crassicostata Lam. Philippin.	3,—
gubernaculum Reeve „	0,50-2
muricata Sow. Oc. pacific	1,—
phrenetica Lam. Philippinen	1,50
semiorbiculata Brug. „	0,50-80
variegata „ Mauritius	0,40-60

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.